

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стоп – зуд® суспензии для лечения заболеваний кожи воспалительной и аллергической этиологии у собак и кошек
(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва,
ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стоп – зуд® суспензия (Stop – itch suspension).

Международное непатентованное наименование: триамцинолон, пиридоксин, рибофлавин, никотинамид, метионин и янтарная кислота.

2. Лекарственная форма: суспензия для орального применения.

Стоп – зуд® суспензия в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: триамцинолон - 1 мг, пиридоксина гидрохлорид - 2 мг, рибофлавин - 4 мг, никотинамид - 10 мг, метионин - 20 мг, кислоту янтарную - 2 мг, а также вспомогательные вещества: натрий - карбоксиметилцеллюлоза, твин-80, натрия бензоат, калия сорбат, аспасвит, ксантановая камедь, глицерин и воду очищенную.

3. По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от светло-желтого до темно-желтого цвета. При хранении препарата допускается расслоение суспензии, исчезающее после взбалтывания.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.

Запрещается применение Стоп – зуд® суспензии по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат по 10 и 15 мл в полимерных флаконах, упакованных поштучно в картонные пачки в комплекте с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Стоп – зуд® суспензию следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Стоп – зуд® суспензия относится к комбинированным противовоспалительным лекарственным препаратам.

10. Входящий в состав препарата триамцинолон является синтетическим глюкокортикоидом, обладает выраженным противовоспалительным и десенсибилизирующим действием. Механизм его действия заключается в блокировании высвобождения эозинофилами медиаторов воспаления, в том числе простагландинов, которые потенцируют воспалительный процесс, стимуляции биосинтеза липокартинов, обладающих противоотечной активностью, уменьшении

количества тучных клеток, вырабатывающих гиалуроновую кислоту, снижении проницаемости капилляров.

Витамины группы В (РР, В₆, В₂), янтарная кислота и метионин улучшают обмен веществ, ускоряют регенерацию тканей, способствуют восстановлению функционального состояния кожного покрова.

Стоп – зуд[®] суспензия по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Стоп – зуд[®] суспензию назначают собакам и кошкам для лечения воспалительных и аллергических заболеваний кожи (атопический дерматит, экземы, диффузный нейродермит, расчесы, алопеции, реакции на укусы насекомых).

12. Противопоказанием к применению Стоп – зуд[®] суспензии является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), вирусные заболевания и диабет.

13. Стоп – зуд[®] суспензию применяют животным перорально в утреннее кормление с небольшим количеством корма или вводят принудительно с помощью шприца-дозатора 1 раз в сутки в следующих суточных дозах:

Вид животного	Масса животного, кг	Суточная доза Стоп – зуд [®] суспензии, мл/животное
Собаки	до 10	0,5
	10-20	1,0
	20-30	1,5
	30-40	2,0
	более 40	2,0
Кошки	1-3	0,25
	3 и более	0,5

Первые 4 суток препарат применяют в терапевтической дозе, последующие 8 суток - в дозе ½ от терапевтической. Курс лечения может быть продлен по усмотрению лечащего ветеринарного врача.

14. При передозировке у животного возможно угнетение и рвота.

15. При первом применении препарата в редких случаях у животного наблюдается быстро проходящая гиперсаливация.

16. Не рекомендуется применять препарат беременным и лактирующим самкам, а также щенкам и котятм до 8-ми недельного возраста.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У отдельных животных при повышенной индивидуальной чувствительности возможно угнетение, слюнотечение, расстройства желудочно-кишечного тракта. В этих случаях применение препарата прекращают и при необходимости назначают симптоматические средства.

19. Стоп – зуд[®] суспензию не рекомендуется применять одновременно с другими

лекарственными препаратами, содержащими кортикостероидные гормоны.

20. Стоп – зуд® суспензия не предназначена для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе со Стоп – зуд® суспензией следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом. Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Стоп – зуд® суспензией. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Стоп – зуд суспензии, утвержденная Россельхознадзором 12 июля 2013года.

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-13.13-2867 № ПВР-3-1.8/02094