

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению Палочек внутриматочных с ихтиолом для профилактики и  
лечения воспалительных процессов матки у коров, овец и коз

(Организация-разработчик: ООО НПП «Агрофарм»; Россия,  
394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, к 18)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Палочки внутриматочные с ихтиолом (*Bacilli intrauteri cum Ichthyolo*).

Международное непатентованное наименование: ихтаммол.

2. Лекарственная форма: суппозитории для внутриматочного введения.

Палочки внутриматочные с ихтиолом в качестве действующего вещества в одной палочке массой 10 г содержат ихтиол (аммониевую соль сульфокислот сланцевого масла) – 1 г и вспомогательные компоненты: полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400.

3. По внешнему виду препарат представляет собой палочки цилиндрической формы с заостренным концом темно-бурого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения 2 года со дня производства. После первого вскрытия упаковки лекарственный препарат можно использовать в течение 1 месяца.

Запрещается применение Палочек внутриматочных с ихтиолом по истечении срока годности.

4. Палочки внутриматочные с ихтиолом выпускают расфасованными по 5 штук в контурную ячейковую упаковку или в двойной полиэтиленовый пакет, запаянный термическим способом или закрытый защелкой «гриппер». Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

5. Палочки внутриматочные с ихтиолом хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 до 20°C.

6. Палочки внутриматочные с ихтиолом следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускаются Палочки внутриматочные с ихтиолом без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Фармакологическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства.

10. Ихтиол - аммониевая соль сульфокислот сланцевого масла – относится к антисептическому средству, содержащему серу. За счет содержащихся в нем ароматических соединений и органически связанной серы, ихтиол оказывает антимикробное, противопаразитарное, противовоспалительное, кровоостанавливающее, местноанестезирующее и кератопластическое действие. При непосредственном действии на кожу и слизистые вызывает слабое раздражение чувствительных нервных окончаний, сменяющееся понижением их чувствительности, что приводит к возникновению рефлексов, изменяющих трофику тканей. Вызывает денатурацию белковых молекул. Благоприятно влияет на область воспаления кожи и подкожных слоев: регулирует сосудистый тонус, восстанавливает кровообращение, улучшает обмен веществ.

Полиэтиленоксидная основа оказывает дегидратирующее действие.

При внутриматочном введении препарата ихтиол оказывает противовоспалительное действие в основном в эндометрии.

Выходит из организма животного преимущественно с вагинальным секретом.

Палочки внутриматочные с ихтиолом по степени воздействия на организм относятся к веществам «малоопасным» (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованных дозах не оказывают сенсибилизирующего действия.

## III. Порядок применения

11. Палочки внутриматочные с ихтиолом применяют коровам, овцам и козам для лечения и профилактики воспалительных процессов матки после оказания родовспоможения, кесарева сечения, оперативного отделения последа, при послеродовых эндометритах.

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к ихтиолу.

13. Препарат вводят в полость матки:

- с лечебной целью: коровам - по 3-5 палочек, овцам и козам - 1-2 палочки через каждые 24 часа до клинического выздоровления (но не более 5 раз);

- с профилактической целью (после оказания родовспоможения или оперативного отделения последа): коровам - по 3-5 палочек, овцам и козам - 1-2 палочки однократно.

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата. Палочки вводят в шейку матки рукой, одетой в полиэтиленовую перчатку разового использования, или с помощью корнцанга и проталкивают в полость матки

14. Симптомов передозировки у животных не выявлено.

15. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

17. При применении Палочек внутриматочных с ихтиолом в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические препараты.

18. Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств.

19. Молоко, полученное от животных во время лечения и в течение 2 суток после последнего применения Палочек внутриматочных с ихтиолом, используют в корм животным после термической обработки. Использование молока в пищу людям допускается через 2 суток после последнего введения препарата.

Мясо животных, убитых в период лечения и в течение 2 суток после последнего применения препарата, используют для производства мясокостной муки. Использование мяса в пищу для людей допускается через 2 суток после последнего введения препарата.

#### IV. Меры личной профилактики

20. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Палочек внутриматочных с ихтиолом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

21. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Палочками внутриматочными с ихтиолом.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки, их необходимо промыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Палочек внутриматочных с ихтиолом, утвержденная Россельхознадзором 06 июня 2012 г.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО НПП «Агрофарм»; Россия,  
394087, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.114-б

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО НПП «Агрофарм»; Россия,  
394087, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.114-б

Номер регистрационного удостоверения

15-3-12.12-3279 N173P-3-15100159