

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

25.06.2021

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Террамицин Аэрозоль Спрей (Terramycin Aerosol Spray)

(Организация-разработчик: «Zoetis Inc», 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, USA)

Номер регистрационного удостоверения:
840-3-5.18-4127№ПВИ-3-2.2/00986

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Террамицин Аэрозоль Спрей (Terramycin Aerosol Spray).

Международное непатентованное наименование: окситетрациклин.

2. Лекарственная форма: аэрозоль для наружного применения.

Террамицин Аэрозоль Спрей в одном баллоне содержит в качестве действующего вещества окситетрациклина гидрохлорид - 4.0 г, а в качестве вспомогательных веществ изопропиловый спирт, полисорбат 80, пейтент голубой, n-бутан.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой мелкодисперсный аэрозоль синего цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения составляет 2 года с даты производства.

Запрещается применять Террамицин Аэрозоль Спрей после истечения срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 150 мл в алюминиевых баллонах вместимостью 210 мл, снабженных распылительными головками, специальными мерными клапанами и колпачками.

5. Хранят Террамицин Аэрозоль спрей в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре не выше 25 °С.

6. Террамицин Аэрозоль Спрей следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: антибактериальный препарат группы тетрациклинов.

10. Окситетрациклин – действующее вещество препарата – обладает широким спектром действия в отношении многих видов грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих кожные инфекции, в том числе *Fusobacterium necroforum*.

Механизм бактериостатического действия окситетрациклина основан на подавлении белкового синтеза в микробной клетке на рибосомальном уровне. При наружном применении лекарственный препарат не адсорбируется.

Террамицин Аэрозоль спрей по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Террамицин Аэрозоль Спрей применяют самостоятельно или в составе комплексной терапии крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям, лошадям, собакам, кошкам, кроликам для лечения:

- заболеваний кожи, копыт и межкопытцевой щели бактериальной этиологии (включая хирургические раны, раны травматического происхождения, ссадины, царапины),

- некробактериоза крупного рогатого скота и овец.

12. Лекарственный препарат запрещается применять животным с индивидуальной повышенной чувствительностью к антибиотикам тетрациклиновой группы.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения. При работе с препаратом запрещается пить, курить, принимать пищу. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Террамицином Аэрозолем Спреем. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Препарат разрешено применять беременным животным, самкам в период лактации, а также молодняку животных.

15. Перед нанесением препарата рекомендуется очистить обрабатываемую поверхность от гноя, раневого экссудата, некротизированных тканей, удалить шерсть.

Перед употреблением препарат необходимо хорошо встряхнуть и распылять с расстояния 18-20 см от пораженного участка в течение 2-3 секунд. При необходимости повторную обработку проводят каждые 7 дней до полного излечения, но не более 4 раз. В случаях глубоких и инфицированных ран местное лечение рекомендуется сочетать с комплексной терапией.

16. При применении Террамицина Аэрозоль Спрея в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

17. Симптомы передозировки не установлены.

18. Применение Террамицина Аэрозоль Спрея не исключает использования других лекарственных препаратов специфической и симптоматической терапии.

19. Особенности действия при первом применении и отмене Террамицина Аэрозоля Спрея не выявлено. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты или другое симптоматическое лечение.

20. В случае пропуска одной дозы курс лечения следует возобновить в предусмотренных инструкцией дозировках и схеме применения.

21. Убой животных в период применения препарата проводят без ограничений.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

«ИГС Аэрозол ГмбХ», Им Хеммет 1 и 2,
79664 Wehr, Германия / «IGS Aerosols
GmbH», Im Hemmet 1 und 2, 79664 Wehr,
Germany.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий
от потребителя.

ООО «Зоэтикс»; 123112, РФ, Москва,
Пресненская набережная, д. 10