

09.08.2021

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле)

(организация-разработчик: ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, г. Саратов,
ул. им. Осипова В.И., дом 1)

Номер регистрационного удостоверения: 44-3-13.13-3020№ПВР-3-4.0/00453

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
- торговое наименование - Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) (Tetravit (complex of vitamins A, D₃, E, F in oil));

- международные непатентованные наименования - витамин А, витамин D₃, витамин Е, витамин F.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций и орального применения.

Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: витамин А (ретинола пальмитат (ацетат)) - 50000 МЕ, витамин D₃ (холекальциферол) - 25000 МЕ, витамин Е (токоферола ацетат) - 20 мг, витамин F - 5 мг, а также вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, бензиловый спирт; масла жирные растительные: подсолнечное, оливковое, миндальное.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от светло-желтого до желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки - 28 суток.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) выпускают расфасованным по 20, 50, 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками с клипсами контроля первого вскрытия. Флаконы с препаратом допускается упаковывать в индивидуальные пачки из картона. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 25°С.

6. Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: витамины и витаминоподобные средства.

10. Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) восполняет недостаточность витаминов в организме животных. Витамин А регулирует строение, функции и регенерацию эпителиальных тканей и тем самым повышает сопротивляемость инфекции. Повышенные дозы витамина А в организме животного препятствуют снижению веса и повышают обмен веществ.

Витамин D₃ регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на их всасывание в желудочно-кишечном тракте, обладает противорахитным действием.

Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃.

Витамин F представляет собой смесь незаменимых омега-3 и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот. В организме принимает участие в синтезе жиров (особенно насыщенных), метаболизме холестерина, обладает противовоспалительным и антигистаминным эффектом, стимулирует иммунную защиту организма и заживление ран. В комплексе с витамином D₃ способствует ассимиляции кальция и фосфора, что является необходимым для костной ткани.

Введение лекарственного препарата в организм приводит к быстрому возрастанию концентрации витаминов в крови и накоплению их в печени и других тканях.

Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах хорошо переносится животными, не оказывает местно-раздражающего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и sensibilizing действия.

III. Порядок применения

11. Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов; повышения выносливости в стрессовых ситуациях; когда увеличивается потребность в витаминах из-за дополнительных нагрузок: во время беременности (только во второй половине); в период лактации, при нарушениях воспроизводительной функции; при транспортировке животных; при замене рациона; при задержке роста и недостаточном привесе; при инфекционных и инвазионных заболеваниях (в качестве вспомогательного средства): при ветеринарных мероприятиях: профилактических прививках и дегельминтизации; после оперативных вмешательств или травм.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является гипервитаминоз и сверхчувствительность к компонентам препарата.

13. При работе с лекарственным препаратом Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле). Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы с препаратом руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Применение лекарственного препарата Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) беременным животным возможно только во второй половине беременности, лактирующим и потомству животных под контролем ветеринарного врача. Супоросным свиноматкам лекарственный препарат вводят за 3-4 недели до опороса, сухостойным коровам за 1-1,5 месяца до отела.

15. Препарат вводят внутримышечно, подкожно или орально животным в следующих дозах (на животное в сутки):

Вид животного	Доза, мл	Вид животного	Доза, мл
Крупный рогатый скот	5,0-6,0	Поросята-отъемыши	1,5
Лошади	3,0-5,0	Ремонтный молодняк свиней	2,0
Телята, жеребята	2,0-3,0	Поросята-сосуны	1,0
Овцы, козы	1,0-2,0	Новорожденные поросята	0,5
Ягнята	1,0	Собаки	0,2-1,0
Свиньи	3,0-5,0	Кролики	0,2

С профилактической целью препарат вводят животным 1 раз в 2-3 недели, с лечебной целью - один раз в 7-10 дней.

При оральном введении препарат дают животным в смеси с кормом ежедневно в течение трех недель.

Одновременно с назначением препарата необходимо сбалансировать рационы по протеину, кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.

16. При применении в рекомендуемых дозах в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не выявлено. При повышенной индивидуальной чувствительности у некоторых животных наблюдается возбуждение, саливация, атаксия, учащенная дефекация и мочеиспускание. В этих случаях применение препарата прекращают, вводят антигистаминные препараты, проводят симптоматическую и дезинтоксикационную терапию.

17. При передозировке лекарственного препарата у животного может наблюдаться: нарушение координации движений, саливация, угнетение. Применяют симптоматические средства и меры, направленные на ускоренное выведение препарата из организма.

18. Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) нельзя применять одновременно с кортикостероидными гормонами - способствуют выведению витамина D из организма, а также нарушают всасывание и обмен кальция. Одновременное применение препарата Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) с сердечными гликозидами может усиливать их токсическое действие (повышается риск проявления нарушений ритма сердца). Одновременное применение с тетрациклинами увеличивают риск развития внутричерепной гипертензии.

С осторожностью применяют при одновременном назначении с НПВС, сердечными гликозидами, так как препарат усиливает их действие.

При оральном применении ацетилсалициловая кислота и масляные слабительные средства ухудшают всасывание витаминов.

19. Особенности действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

20. При пропуске приема одной или нескольких доз лекарственного препарата применение осуществляется по той же схеме в соответствии с настоящей инструкцией. Не следует вводить двойную дозу для компенсации пропущенной.

21. Продукцию от животных, которым применяли Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения. ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов ул. им. Осипова В.И., д.1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя. ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов ул. им. Осипова В.И., д. 1.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению лекарственного препарата Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле), согласованная Россельхознадзором 25 января 2019 года.