



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
**ТРАНЕКСАМ-ВЕТ**

организация-разработчик: ООО «РЕПРОВЕТ»,  
140563, Московская обл., г.о.Коломна, г. Озеры, ул. Ленина, д. 252

Номер регистрационного удостоверения:

44-3-21.25-5385-S ПВР-3-21.25/04135

**I. Общие сведения**

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
  - торговое наименование: ТРАНЕКСАМ-ВЕТ
  - международное непатентованное наименование: транексамовая кислота
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций  
ТРАНЕКСАМ-ВЕТ содержит в 1 мл препарата в качестве действующего вещества транексамовую кислоту - 100 мг, а в качестве вспомогательных веществ – нипагин и воду для инъекций.
3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.  
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 2 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток при соблюдении условий хранения.  
Запрещается применение ТРАНЕКСАМ-ВЕТ по истечении срока годности.
4. ТРАНЕКСАМ-ВЕТ выпускают расфасованным по 100 мл во флаконы из темного стекла соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 25°C.
6. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

**II. Фармакологические свойства**

9. Фармакотерапевтическая группа: ТРАНЕКСАМ-ВЕТ относится к группе ингибиторов фибринолиза.
10. Транексамовая кислота – антифибринолитическое средство, специфически ингибирующее активацию профибринолизина (плазминогена) и его

превращение в фибринолизин (плазмин). Она оказывает общее гемостатическое действие при различных видах кровотечений, подавляя фибринолиз, стимулируя выработку тромбоцитов, препятствует повышению хрупкости сосудов. Также транексамовая кислота за счет подавления образования кининов и других активных пептидов, участвующих в аллергических и воспалительных реакциях, обладает противоаллергическим и противовоспалительным действием.

ТРАНЕКСАМ-ВЕТ по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (5 классу токсичности согласно Системе классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС)).

### III. Порядок применения

11. ТРАНЕКСАМ-ВЕТ назначают собакам с целью профилактики и остановки хирургических и посттравматических кровотечений.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. ТРАНЕКСАМ-ВЕТ не следует назначать животным с повышенным риском тромбозов и при гематурии, вызванной заболеванием паренхимы почек.

13. Меры предосторожности: при работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Исследования по применению транексамовой кислоты беременным и кормящим сукам не проводились. В случае необходимости применение препарата возможно по назначению ветеринарного врача, если ожидаемая польза превышает риск.

15. Препарат применяют внутривенно медленно, в дозе 10 мг транексамовой кислоты на 1 кг массы тела животного, что эквивалентно 1 мл препарата на 10 кг массы животного.

Препарат применяют однократно. Для предотвращения хирургического кровотечения препарат следует вводить за 20-30 минут до операции.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При внутривенном введении возможна рвота.

В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают десенсибилизирующую терапию.

17. При рекомендуемых дозах препарата ТРАНЕКСАМ-ВЕТ существенные побочные эффекты не выявлены. Симптомы передозировки: рвота, судороги.

18. Применение ТРАНЕКСАМ-ВЕТ не исключает применения средств этиотропной, заместительной и патогенетической терапии. Препарат не следует назначать одновременно с другими кровоостанавливающими средствами. Одновременное применение с гормональными препаратами, предназначенными для регуляции полового цикла, может увеличить риск тромбообразования.
19. Особенности действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не установлено.
20. Препарат не предназначен для курсового применения, повторное введение осуществляется в случае необходимости.
21. Препарат не предназначен продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «РЕПРОВЕТ», 140563,  
Московская обл., г.о. Коломна  
г. Озеры, ул. Ленина, д. 252.

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «РЕПРОВЕТ», 140563,  
Московская обл., г.о. Коломна  
г. Озеры, ул. Ленина, д. 252.

Генеральный директор ООО «РЕПРОВЕТ»

А.В. Титов

