

26 MAR 2024

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата

Тривит[®] раствор для инъекций

(организация-разработчик: АО «Мосагроген»,
117545, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Центральное,
проезд 1-й Дорожный, д. 1)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2.12-0568№ПВР-3-1.9/00004

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Тривит[®] раствор для инъекций (Trivit solutio pro injectionibus).

Международные непатентованные и группировочные наименования действующих веществ: ретинол, колекальциферол, альфа-токоферол.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Тривит[®] раствор для инъекций в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: ретинола ацетат или пальмитат (витамин А) – 30000 МЕ, колекальциферол (витамин D₃) – 40000 МЕ, альфа-токоферола ацетат (витамин Е) – 20 мг, в качестве вспомогательного вещества – масло растительное (подсолнечное или соевое).

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от светло-желтого до желтого цвета. Допускается легкая опалесценция.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства. Запрещается использование лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Тривит[®] раствор для инъекций выпускают расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы объемом 10 мл упаковывают в картонные коробки по 20 штук. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Тривит® раствор для инъекций следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Тривит® раствор для инъекций отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Тривит® раствор для инъекций относится к фармакотерапевтической группе: витамины и витаминopodobные средства.

10. Оказывает комплексное действие на организм животных и птицы, выражающееся в нормализации обмена веществ, профилактике гипо- и авитаминозов А, D₃, Е и заболеваний, развивающихся на их фоне.

Тривит® раствор для инъекций по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Тривит® раствор для инъекций применяют для профилактики гиповитаминозов у сельскохозяйственных животных и птицы. Препарат показан при ксерофтальмии, рахите, остеомалации и нарушении функции воспроизводства животных и птиц.

12. Препарат противопоказан при индивидуальной непереносимости компонентов препарата, с осторожностью препарат применяют животным с нарушениями функции печени и почек.

13. При работе с препаратом Тривит® раствор для инъекций следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно

обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Беременным и новорожденным животным препарат применяют с осторожностью по строгим показаниям и под наблюдением ветеринарного врача, лактирующим животным препарат применяют без ограничений.

15. Препарат вводят животным и птице внутримышечно или подкожно 1 раз в неделю в течение месяца в дозах, указанных в таблице. При необходимости инъекции препарата повторяют через месяц.

Вид животных	Внутримышечно или подкожно, мл/животное
Крупный рогатый скот	2,0 – 5,0
Лошади	2,0 – 2,5
Жеребята, телята	1,5 – 2,0
Овцы, козы	1,0 – 1,5
Ягнята, поросята	0,5 – 1,0
Свиньи	1,5 – 2,0
Куры	0,1 – 0,2
Собаки	0,5 – 1,0
Кролики	0,2 – 0,3

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у сельскохозяйственных животных и птицы, как правило, не наблюдается.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Применение препарата Тривит[®] раствор для инъекций не исключает использование других лекарственных средств.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при отмене не установлено.

20. При случайном увеличении интервала между двумя введениями препарата, его следует ввести как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

21. Продукцию животноводства и птицеводства после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545,
г. Москва,
1-ый Дорожный проезд, д. 1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545,
г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ
Чертаново Центральное,
проезд 1-й Дорожный, д. 1.
т/ф (495) 744-06-45.

Зам. генерального директора
АО «Мосагроген», к.т.н.



И.А. Казакова