

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Тривита[®] раствора для инъекций
для профилактики гиповитаминозов у сельскохозяйственных
животных, в том числе птиц
(организация-разработчик: ЗАО «Мосагроген»,
142000, Московская область, г. Домодедово, Кутузовский проезд, д.10-77)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Тривит[®] (Trivit[®]).

Международное непатентованное наименование: масляный раствор витаминов А, D₃, Е.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Тривит[®] в 1 мл содержит в качестве действующих веществ: ретинола (витамина А) ацетата или пальмитата – 30000 МЕ, холекальциферола (витамина D₃) - 40000 МЕ, альфа-токоферола (витамина Е) ацетата - 20 мг, в качестве вспомогательных веществ: бутилгидрокситолуол, масло растительное (подсолнечное или соевое).

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. Запрещается использование лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Тривит[®] выпускают расфасованным по 10, 20 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5 °C до 25 °C.

6. Тривит[®] следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Тривит[®] отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Тривит[®] относится к группе витаминных препаратов.

10. Оказывает комплексное действие на организм животных и птицы, выражющееся в нормализации обмена веществ, профилактике гипо- и авитаминозов А, D₃, Е и заболеваний, развивающихся на их фоне.

Тривит[®] по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Тривит[®] в виде инъекционного раствора применяют для профилактики гиповитаминозов у сельскохозяйственных животных и птицы. Препарат показан при ксерофталмии, рахите, остеомаляции и функциональных расстройствах плодовитости животных и птиц. Рекомендуется использовать при беременности, лактации, а также в период реабилитации организма после болезни.

12. Противопоказаний не выявлено.

13. Препарат вводят животным и птице внутримышечно или подкожно 1 раз в неделю в течение месяца в дозах, указанных в таблице. При необходимости инъекции препарата повторяют через месяц.

Вид животных	Внутримышечно или подкожно, мл/животное
Крупный рогатый скот	2,0 – 5,0
Лошади	2,0 – 2,5
Жеребята, телята	1,5 – 2,0
Овцы, козы	1,0 – 1,5
Ягнята, поросыта	0,5 – 1,0
Свиньи	1,5 – 2,0
Куры	0,1 – 0,2
Собаки	0,5 – 1,0
Кролики	0,2 – 0,3

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при отмене не установлено.

16. Тривит[®] можно применять беременным, лактирующим животным и их молодняку без ограничений по возрасту.

17. При случайном увеличении интервала между двумя введениями препарата, его следует ввести как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у сельскохозяйственных животных и птицы, как правило, не наблюдается.

19. Применение Тривита[®] раствора для инъекций не исключает использование других лекарственных средств.

20. Продукцию животноводства и птицеводства после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Тривитом® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тривитом®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата
для ветеринарного применения.

ЗАО «Мосагроген»
Российская Федерация,
117545, г. Москва,
1-ый Дорожный проезд, д. 1.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной владельцем или держателем
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя.

ЗАО «Мосагроген»,
Российская Федерация,
142000, Московская обл., г.
Домодедово,
Кутузовский пр., д.10-77.

С согласованием настоящей Инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 28.02.2012 г.

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2.12-0568 №ПВР-3-1.9/00004