

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Трококсила

в качестве противовоспалительного и анальгетического средства у собак  
(организация-разработчик: «Zoetis Inc», 100 Campus Drive , Florham Park, New  
Jersey, 07932 USA)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Трококсил (Тросохил).

Международное непатентованное наименование: мавакоксиб.

2. Лекарственная форма: таблетки по 6 мг, 20 мг, 30 мг, 75 мг и 95 мг для перорального применения.

Таблетка Трококсил 6 мг содержит в качестве действующего вещества мавакоксиб – 6 мг, а в качестве вспомогательных веществ сахарозу, микрокристаллическую целлюлозу, кроскармеллозу натрия, натрия лаурилсульфат, магния стеарат и ароматизатор со вкусом мяса.

Таблетка Трококсил 20 мг содержит в качестве действующего вещества мавакоксиб – 20 мг, а в качестве вспомогательных веществ сахарозу, микрокристаллическую целлюлозу, кроскармеллозу натрия, натрия лаурилсульфат, магния стеарат и ароматизатор со вкусом мяса.

Таблетка Трококсил 30 мг содержит в качестве действующего вещества мавакоксиб – 30 мг, а в качестве вспомогательных веществ сахарозу, микрокристаллическую целлюлозу, кроскармеллозу натрия, натрия лаурилсульфат, магния стеарат и ароматизатор со вкусом мяса.

Таблетка Трококсил 75 мг содержит в качестве действующего вещества мавакоксиб – 75 мг, а в качестве вспомогательных веществ сахарозу, микрокристаллическую целлюлозу, кроскармеллозу натрия, натрия лаурилсульфат, магния стеарат и ароматизатор со вкусом мяса.

Таблетка Трококсил 95 мг содержит в качестве действующего вещества мавакоксиб – 95 мг, а в качестве вспомогательных веществ сахарозу, микрокристаллическую целлюлозу, кроскармеллозу натрия, натрия лаурилсульфат, магния стеарат и ароматизатор со вкусом мяса.

3. По внешнему виду Трококсил представляет таблетки треугольной формы светло-коричневого цвета с вытисненным содержанием мавакоксиба в таблетке с одной стороны.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 36 месяцев с даты производства. Запрещается применять Трококсил по истечении срока годности.

4. Трококсил выпускают в блистерах по 2 таблетки, которые помещают в картонные коробки и снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят Трококсил в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищённом от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0 °С до 30 °С.

6. Трококсил следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

8. Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Трококсил относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, и обладает противовоспалительным, анальгетическим и жаропонижающим действием.

10. Мавакоксиб – действующее вещество Трококсила – действует как селективный ингибитор циклооксигеназы, предотвращая переход арахидоновой кислоты в простагландины, которые участвуют в развитии воспалительного процесса. При этом лекарственный препарат преимущественно влияет на циклооксигеназу-II, которая индуцируется в ответ на развитие воспаления. В результате блокируется синтез воспалительных простагландинов, вызывающих воспаление, отек и боль. В терапевтических дозах мавакоксиб значительно слабее действует на циклооксигеназу-I, и благодаря этому не оказывает влияния на синтез протективных простагландинов. Таким образом, мавакоксиб не препятствует физиологическим процессам в тканях, особенно в желудке, кишечнике, почках и тромбоцитах.

Трококсил быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, достигает терапевтической концентрации через 1 час после введения, а пика концентрации в плазме крови – через 17 часов после введения, при биодоступности около 87%. Период полувыведения у собак составляет около 39 дней. Мавакоксиб более чем на 98% связывается с белками плазмы. Мавакоксиб в неизменном виде выделяется главным образом с желчью.

Трококсил по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007)

## III. Порядок применения

11. Трококсил применяют в качестве противовоспалительного и анальгетического средства при дегенеративных заболеваниях суставов у собак.

12. Противопоказаниями к применению Трококсила являются: возраст животного до 12 месяцев и/или масса тела менее 3 кг; гиперчувствительность животного к компонентам лекарственного препарата; язвенная болезнь желудочно-кишечного тракта, выраженная почечная недостаточность.

Лекарственный препарат назначают с осторожностью беременным животным и в период лактации.

13. Трококсил применяют собакам, начиная с 12 месячного возраста, перорально в дозе 2 мг мавакоксиба на 1 кг массы животного до или во время приема пищи. Повторно лекарственный препарат применяют через 2 недели после первого приема, а далее с интервалом 1 месяц. Курс лечения Трококсилом не должен превышать 7 приемов препарата, то есть 6,5 месяцев.

Количество таблеток в зависимости от массы животного указано в таблице:

Масса животного (кг)	Количество таблеток на животное
3-4	таблетка 6 мг
5-6	две таблетки 6 мг
7-10	таблетка 20 мг
11-15	таблетка 30 мг
16-20	две таблетки 20 мг
21-23	таблетка 20 мг + таблетка 30 мг
24-30	две таблетки 30 мг
31-37	таблетка 75 мг
38-47	таблетка 95 мг
48-52	таблетка 30 мг + таблетка 75 мг
53-62	таблетка 30 мг + таблетка 95 мг
63-75	две таблетки 75 мг

14. Симптомами передозировки являются рвота, диарея. Данные симптомы возникали при введении препарата в дозе 15 мг/кг и более.

В случае передозировки проводят симптоматическую терапию.

15. Особенности действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

16. Лекарственный препарат назначают с осторожностью беременным животным и в период лактации.

17. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести ее как можно скорее. Далее интервал до следующего введения препарата не изменяется.

18. При применении Трококсила в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случаях у отдельных животных возможно снижение аппетита, диарея, рвота, апатия, изменение почечных биохимических показателей. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства, адреномиметики и/или другое симптоматическое лечение.

19. Не допускается совместное применение Трококсила с другими нестероидными противовоспалительными препаратами и кортикостероидами. Применение Трококсила возможно не ранее через 24 часа после последнего введения другого нестероидного противовоспалительного препарата.

20. Трококсил не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При применении Трококсила необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом.

22. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками их следует промыть большим количеством воды.

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения:

Пфайзер Италия Эс.Эр.Эл., Виа Дель  
Коммерчио 25/27 63100 Марино дель  
Тронто (ЭйПи), Италия/ Pfizer Italia S.r.l.,  
Via del Commercio 25/27 63100 Marino del  
Tronto (AP), Italy.

Фармация Энд Апджон Компани 7000  
Портедж Роуд, Каламазу, Мичиган 49001,  
США / Pharmacia & Upjohn Company, 7000  
Portage Road Kalamazoo, MI 49001, USA

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «Зоэтис»: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция на лекарственный препарат для ветеринарного применения Трококсил, утверждённая Россельхознадзором 4 марта 2014 г.

Номер регистрационного удостоверения: 840-3-13.15-2837 и ПКМ-3-3.0/03881