

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель  
Руководителя  
Россельхознадзора

---

02.02.2021

---

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Веракол®

(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн», 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-7.15-2788№ПВР-3-7.6/01889

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Веракол® (Verakol®).  
Международное непатентованное наименование: не присвоено.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.  
В качестве действующих веществ Веракол® содержит минеральный компонент и матричные настойки растительного происхождения (в 1000 мл): Acidum arsenicosum  
Ø=D2 – 0,5 нл, Citrullus colocynthis Ø=D1 – 5 нл, Podophyllum peltatum Ø – 1,5 нл, Veratrum album Ø=D1 – 5 нл и вспомогательные вещества: метил парагидроксibenзоата натриевую соль, натрия хлорид, натрия ацетата тригидрат, кислоту соляную, воду для инъекций.
3. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Веракол® запрещается применять по истечении срока годности.
4. Выпускают Веракол® расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы по 10 мл поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.
5. Веракол® хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30 °С.
6. Веракол® следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Веракол<sup>®</sup> относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам для ветеринарного применения.

10. Веракол<sup>®</sup> обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсibiliзирующим действием.

## III. Порядок применения

11. Веракол<sup>®</sup> назначают собакам, кошкам и сельскохозяйственным животным для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе сопровождающихся диареей (гастрит, гастроэнтерит, диспепсия, пищевая токсикоинфекция).

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

13. При работе с Вераколом<sup>®</sup> следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Веракола<sup>®</sup> следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Противопоказаний и особенностей применения Веракола<sup>®</sup> самкам в период беременности и лактации не установлено.

15. Веракол<sup>®</sup> применяют внутримышечно или подкожно 2-3 раза в сутки в течение 5-10 дней в следующих разовых дозах:

- собакам – 0,1 мл/1 кг массы животного;
- кошкам – 0,1 мл/1 кг массы животного (но не менее 0,5 мл/животное);
- крупному рогатому скоту, свиньям – 5,0 мл/животное;
- телятам, пороссятам – 2,5 мл/животное.

16. При применении Веракола<sup>®</sup> в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.

18. Применение Веракола<sup>®</sup> не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности.

В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

21. Продукция животного происхождения во время и после применения Веракола® может быть использована без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «АлексАнн»,  
141700, Российская Федерация,  
Московская обл., г. Долгопрудный,  
ул. Виноградная, д. 13

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «АлексАнн»,  
141700, Российская Федерация,  
Московская обл., г. Долгопрудный,  
ул. Виноградная, д. 13