

Инструкция  
по применению шипучих таблеток «Ветоклин»  
для поддержания здоровья кожи и шерсти животного и предупреждения  
кожных бактериальных и грибковых инфекций.

(Организация-разработчик: компания BARD – Bio Agens Research and  
Development,  
Rýznerova150 / 15 252 62 Únětice, Чехия)

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование «Ветоклин» («Vetoclin»)
2. Форма: шипучие таблетки для приготовления раствора.  
Ветоклин изготовлен из ооспор *Pythium oligandrum* 4-7% с добавлением формообразующих и стабилизирующих компонентов (сорбитол 25%, лимонная кислота – 33%, бикарбонат натрия - 26<sup>0</sup>, кремний 4-7%, ПЭГ 6000- 3,4 %, карбонат натрия 2,6%).
3. По внешнему виду представляет собой таблетку круглой формы без рисок, от белого до кремового цвета, с коричневыми вкраплениями.  
Вес одной таблетки 3 грамма, упакованы в тубы по 3, 5 и 10 таблеток, или индивидуальные саше по 1 таблетке.
4. Таблетки Ветоклин транспортируют и хранят в темном, сухом и теплом месте при температуре 15-20 С.

## 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Ветоклин – содержит в своем составе микроорганизм *Pythium Oligandrum*, непатогенный микроорганизм, обладающий биологическим антагонизмом к дерматофитам, способствующий естественному балансу флоры кожи, применяющийся в случае грибковых и бактериальных поражений кожи, в том числе при поражении *Trichophyton spp.*, *Microsporum spp.* и дрожжевых инфекциях (*Malassezia pachydermatis*, *Candida albicans*).

### 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

1. Ветоклин предназначен всем видам животных для улучшения качества шерстного и кожного покрова, для удаления перхоти и предотвращения появления перхоти, укрепления ороговевшего слоя копыт и когтей животных, а также для обработки мест пребывания животных (лежаки, домики, будки и т.п.) и предметов ухода.
2. Применяется для всех видов животных, без возрастных ограничений.  
Для приготовления рабочего раствора таблетку растворить в 2 л теплой (около 34<sup>0</sup> С) воды в течение 20-30 минут, затем обработать полученным раствором кожные покровы, шерсть, когти или копыта животных, при необходимости места содержания животного, его амуницию, игрушки, миски. Раствор должен высохнуть естественным путем. Обработка проводится один раз в день с интервалом 48 часов в течение 7-8 дней или более (до 3 недель) в зависимости от полученного эффекта применения. Приготовленный раствор должен быть использован в течение 24 часов.
3. Одной таблетки достаточно для обработки одного животного и/или мест его содержания. При обработке подстилок, игрушек и прочих аксессуаров схема разведения та же.
4. Микроорганизм не проникает в кожу и не является жизнеспособным при проглатывании. Прием внутрь, путем облизывания, не является вредным или токсичным.
5. Лечение Ветоклином не следует сочетать (за пять дней до и через пять дней после) с другим наружным противогрибковым лечением, поскольку Ветоклин может воздействовать на другие наружные препараты.
6. Побочные явления и осложнения при применении в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдаются.
7. Продукт предназначен только для ветеринарного использования.
8. Срок годности таблеток – 5 лет с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортировки. По истечению срока годности продукт к применению не пригоден.

