

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
**Жанилон Микро капли**

(организация-разработчик: Neoterica GmbH / Неотерика ГмбХ  
Grillostr. 18, 45141, Essen, Germany / Грилло штр. 18, 45141, Эссен,  
Германия)

Номер регистрационного удостоверения:

**I. Общие сведения**

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Жанилон Микро капли (Jeanilon Micro drops);  
международное непатентованное наименование действующего вещества:  
диеногест.

2. Лекарственная форма: раствор для приема внутрь.

Жанилон Микро капли в 1 мл в качестве действующего вещества  
содержат диеногест – 0,6 мг, а в качестве вспомогательных веществ:  
эфирное масло кошачьей мяты, бутилгидроксианизол,  
бутилгидрокситолуол, N – Метилпирролидон, альфа-токоферол ацетат,  
масло соевое.

3. По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую  
прозрачную жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в  
закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства. После  
вскрытия флакона – 30 суток.

Жанилон Микро капли по истечении срока годности не должны  
применяться.

4. Выпускают Жанилон Микро капли расфасованными по 3 и 5  
мл в белые полимерные флаконы-капельницы, укупоренные винтовыми  
крышками с контролем первого вскрытия и упакованные поштучно в  
картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке  
производителя, при температуре от 2 °C до 25 °C.

6. Жанилон Микро капли следует хранить в местах, недоступных  
для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в  
соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Фармакологическая группа: гестагены.
10. Входящий в состав препарата синтетический гормон-прогестаген – диеногест действует на гипоталамо-гипофизарную систему, блокируя секрецию гонадотропных гормонов (фолликулостимулирующего и лютеинизирующего), препятствует развитию фолликулов, синтезу эстрогенов и появлению половой охоты. Применение препарата самкам до начала течки предотвращает овуляцию, а в начале фолликулярной фазы (первый-третий день течки) приводит к ее прекращению.

У самцов диеногест снижает уровень тестостерона в крови и, как следствие, угнетает половую активность и связанные с ней поведенческие реакции.

Период полувыведения диеногеста составляет 6-11 ч. Около 86 % введенной дозы препарата выводится в течение 5 дней, причем основная ее часть экскретируется с мочой в первые 24 ч.

Жанилон Микро капли по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности) согласно ГОСТ 12.1.007-76, в рекомендуемых дозах не оказывает тератогенного, сенсибилизирующего и гепатотоксического действия.

## III. Порядок применения

11. Жанилон Микро капли назначают кошкам для задержки и прерывания течки; котам – для снижения половенной активности и коррекции поведения.

12. Противопоказано применение препарата при заболеваниях мочеполовой системы, опухолях, сахарном диабете, неполовозрелым, беременным и лактирующим животным.

13. При работе с Жанилон Микро капли следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончанию работы с препаратом руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Жанилон Микро капли. Запрещается использование пустых упаковок из-под лекарственного средства для бытовых целей; они подлежат утилизации с бытовыми отходами. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. При попадании препарата внутрь необходимо промыть желудок большим количеством воды, а затем принять адсорбент. В случае появления аллергических реакций следует немедленно

обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

14. Не допускается применение Жанилон Микро капли неполовозрелым животным, беременным и лактирующим самкам.

15. Жанилон Микро капли применяют животным перорально (внутрь) за 1 – 2 часа до кормления, капая на корень языка, нанося на кончик носа или на кусочек лакомства. Доза препарата зависит от пола, массы животного и цели его применения. Перед каждым применением флакон с препаратом необходимо тщательно встряхнуть.

Кошкам Жанилон Микро капли применяют:

– для задержки течки и угнетения полового возбуждения в фазах анэструса и проэструса в дозе 3 капли для животных массой тела до 5 кг (0,12 мл/5 кг) один раз в неделю. Курс применения не более 18 месяцев, повторение курса возможно после нормализации полового цикла;

– для прерывания течки при появлении ее первых признаков, но не позже, чем через 2 дня от ее начала, а также для коррекции поведения в дозе 6 капель для животных массой тела до 5 кг (0,25 мл/5 кг) в течение 4-7 дней (до исчезновения признаков течки плюс один день) с интервалом 24 часа.

Котам Жанилон Микро капли применяют:

– для снижения полового возбуждения и коррекции поведения в дозе 6 капель для животных массой тела до 5 кг (0,25 мл/5 кг). Первые 7 дней препарат применяют в суточной дозе, в последующие 14 дней при положительном результате суточную дозу препарата снижают в два раза.

Для животных массой тела более 5 кг препарат применяют в соответствующей дозировке плюс 1 капля раствора на каждый последующий кг массы тела.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Жанилон Микро капли в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено. При длительном применении препарата или повторных курсах приема возможно изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочной железы.

17. Симптомов, возникающих при передозировке Жанилон Микро капли, не установлено.

18. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

19. Особеностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Жанилон Микро капли не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата

АО «Научно-производственная фирма «Экпром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от пользователя

АО «Научно-производственная фирма «Экпром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263

Генеральный директор

Neoterica GmbH, Германия

  
NEOTERICA GmbH  
Grillostrasse 18 45141  
Essen, Deutschland

В.В. Тарабрин