

СОГЛАСОВАНО

Заместитель      Руководителя  
Россельхознадзора

---

2 С. 03. 2022

---

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Зоосорб®

(Организация-разработчик: АО «Полисорб», 456652, Челябинская область,  
г. Копейск, ул. Томская, д.14)

Номер регистрационного удостоверения:

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование – Зоосорб® (Zoosorb)

группировочное наименование – кремния диоксид коллоидный.

2. Лекарственная форма: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.

Зоосорб® в качестве действующего вещества содержит кремния диоксид коллоидный – не менее 92,0%.

3. По внешнему виду препарат представляет собой аморфный порошок белого или почти белого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет с даты производства. Хранить в плотно закрывающейся емкости в течение срока годности. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Зоосорб® выпускают расфасованным по 12, 25, 50 и 100 г в полимерных банках, укупоренных полимерными крышками с контролем первого вскрытия; по 50, 100, 500 г, по 1, 5 и 10 кг в двойных полиэтиленовых пакетах, которые герметично термосварены. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят Зоосорб® отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности не более 60%.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Утилизация неиспользованного лекарственного препарата производится в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска - без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Зоосорб<sup>®</sup> относится к энтеросорбирующим средствам.

10. Фармакологическое действие лекарственного препарата Зоосорб<sup>®</sup> обусловлено выраженной адсорбционной активностью (не менее 130 мг/г) и детоксикационными свойствами кремния диоксида коллоидного.

При пероральном введении Зоосорб<sup>®</sup> сорбирует в желудочно-кишечном тракте и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая патогенные бактерии и бактериальные токсины, антигены, лекарственные препараты, соли тяжелых металлов, радионуклиды, а также ряд продуктов обмена веществ, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, метаболиты, вызывающие эндогенный токсикоз.

Зоосорб<sup>®</sup> не всасывается в желудочно-кишечном тракте и выделяется в неизменном виде с фекалиями.

Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

## III. Порядок применения

11. Зоосорб<sup>®</sup> назначают сельскохозяйственным животным, включая птиц, пушным зверям, собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при заболеваниях, сопровождающихся выраженной интоксикацией, диспепсией, диареей, при отравлениях ядовитыми веществами, токсинами эндогенной и экзогенной природы.

12. Противопоказанием к применению препарата Зоосорб<sup>®</sup> является индивидуальная повышенная чувствительность животного, атония кишечника, кровотечения желудочно-кишечного тракта.

13. При работе с препаратом Зоосорб<sup>®</sup> следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При случайном попадании лекарственного препарата на слизистые оболочки глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Запрещается использование пустой тары из-под лекарственного препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Особенности применения препарата самкам в период беременности и вскармливания приплода, а также новорожденным животным не установлены.

15. Зоосорб<sup>®</sup> применяют животным перорально в виде предварительно приготовленной водной суспензии, два-три раза в сутки, за 1–2 часа до или

через 2 часа после кормления и приема других лекарственных средств. Для приготовления суспензии 1- 3 г препарата вносят в стакан, содержащий 100 мл воды, тщательно перемешивают. Разовые дозы и режим дозирования Зоосорб® указаны в таблице:

Показания к применению	Вид и возраст животного	Рекомендуемые дозы (г/кг массы животного) *)	Схема применения суспензии Зоосорб®
Профилактика желудочно-кишечных заболеваний	новорожденные телята, поросята	0,1–0,2 г/кг	Выпаивают сразу после первой выпойки молозива совместно с 0,9% раствором натрия хлорида и глюкозой, 2–3 раза на протяжении 12 часов. При необходимости курс повторяют на второй день.
	новорожденные котята, щенки, пушные звери	0,05–0,15 г/кг	Выпаивают после отъема 2–3 раза в сутки в течение 5–7 дней.
Лечение желудочно-кишечных заболеваний	взрослый крупный рогатый скот, свиньи	0,2–0,4 г/кг	Выпаивают больным животным за 1 час до (или через 2 часа после) кормления в течение 1–3 дней.
	кошки, собаки, пушные звери	0,2–0,25 г/кг	Выпаивают клинически больным животным в течение 1–3 дней за 1 час до кормления или через 2 часа после кормления.
При отравлениях различной этиологии	все виды животных	0,1–0,5 г/кг	При первых симптомах отравления выпаивают 2–3 раза на протяжении 6 часов. При необходимости на второй день курс лечения повторяют.

\* 1 чайная ложка – 1 г препарата;  
1 столовая ложка – 3 г препарата.

Цыплятам-бройлерам в хозяйствах, неблагополучных по микотоксикозам, Зоосорб® применяют с кормом из расчета 2,5 кг/т комбикорма на весь период выращивания.

16. При применении лекарственного препарата Зоосорб® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и возможных аллергических реакциях использование препарата прекращают.

17. Симптомы передозировки препарата Зоосорб® не выявлены.

18. При использовании в составе комплексной терапии Зоосорб® следует применять за 1–2 часа до или через 2 часа после приема других лекарственных средств, во избежание снижения эффективности лечения животного, или приема корма (кормовой добавки).

19. Особенностей действия лекарственного препарата при первом применении или его отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений режима дозирования и схемы применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы, ее следует ввести как можно скорее, далее Зоосорб® применяют в той же дозе и по той же схеме.

21. Продукция животноводства, полученная в период и после применения препарата Зоосорб® в соответствии с настоящей инструкцией, может быть использована на общих основаниях.

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения.

АО «Полисорб», 456652,  
Челябинская область, г. Копейск,  
ул. Томская, д. 2  
тел./факс: (351) 778-51-26  
тел.: 8-800-100-19-89  
info@zoosorb.com

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной владельцем  
регистрационного удостоверения  
лекарственного препарата на принятие  
претензий от потребителя.

АО «Полисорб», 456652,  
Челябинская область, г. Копейск,  
ул. Томская, д. 14  
тел./факс: (351) 778-51-26  
тел.: 8-800-100-19-89  
info@zoosorb.com

Зам. генерального директора по качеству  
АО «Полисорб»



Заманская Н.И.